PROTOCOLO DE TRATAMIENTO POR VIA TÓPICA CON CREMA

ECA-zonas SENSIBLES , para enfermedad de PEYRONIE

- Duración del tratamiento: Dependiendo del caso de 3 a 12 meses.
- Frecuencia de aplicación: La crema se aplicará de 1 a 3 veces al día. Según disponibilidad y tolerancia dérmica.
- Dosis/cantidad a aplicar: aplicar de 1 a 3 veces al día X 3 dispensaciones de airless 1+1+1, masajeando cada una hasta absorción de la crema) ver **Resumen

Modo de aplicación de la crema

Dosificar el producto en 3 fases (1+1+1) de 1 a 3 veces al día

La primera dosificación del airless de la crema se aplicará sobre toda la superficie del pene extendiéndola y masajeando suavemente hasta total absorción **Recomendaciones de la 1ª fase de masaje general de la crema**. Algunas personas han sufrido irritación o escozor en la parte final del pene cerca del escroto, esta piel es más delicada que la piel del pene, La crema no está pensada para la sensibilidad del escroto. Piensa que cuando repartes la crema la vas acumulando al final del pene y no absorbe toda. En la 1ª fase del masaje, la de repartir por todo el pene, hay que repartir de base a glande, pues de lo contrario si se reparte a modo masturbación se va acumulando en la base del pene).

La segunda dosificación del airless se extenderá sobre todo en las zonas endurecidas, (Fibrosadas y/o calcificadas) masajeándolas con un poco más de presión como intentando disolverlas hasta que la crema se haya absorbido.

La tercera dosificación del airless, se utilizará para masajear, intentando **no estirar el pene traccionándolo como para alargarlo, sino que sólo intentar forzar suavemente enderezando la zona doblada,** siempre que sea posible dicha maniobra de enderezamiento se hará en erección ya que es más efectiva).

Mientras la placa fibrosa no haya disminuido casi totalmente al tacto. desaconsejamos estiramientos forzados manuales, o con extensores de vacío ya que con la crema también ablandas la zona no fibrosa opuesta a la placa, y al estirar el pene, mientras que la zona de la placa fibrosa endurecida exista ofrece más resistencia a la tracción que la parte, pudiendo aumentar el ángulo de torsión.

- debes lavarte con agua, o agua y jabón después de las tres fases del masaje y quitar el exceso de crema no absorbida de la superficie del pene, secándolo post lavado.

.

**Resumen de las aplicación y masaje de ECA zonas sensibles

- 1º dosificación(1 pulsación del airless)+ masaje (Hasta total absorción) masaje general.
- **2º dosificación**(1 pulsación del airless)+ masaje (Hasta total absorción) masaje en la zona de la placa.
- **3º dosificación**(1 pulsación del airless)+ masaje (Hasta total absorción) masaje intentando enderzar la torsión, si conseguimos erección,) en caso contrario volver a trabajar la placa, como en la 2ª dosificación.

SI ES POSIBLE REPETIRLO 2 – 3 VECES AL DIA

Precauciones:

- **Si sientes escozor o irritación en la piel:** Primero debes dejar de aplicarte la crema durante los días necesarios para la normalización de la piel escocida o irritada.

Al iniciar de nuevo el tratamiento empieza primero las tres fases del masaje, una vez al día, incrementado poco a poco la aplicación de la crema a dos o tres veces al día según tolerancia dérmica.

Para evitar que estos problemas vuelvan a reproducirse: Puedes proteger la zona escroto con una toallita infantil de aloe vera, doblándola en cuatro y haciendo un corte en una esquina, de forma que al desdoblarla te quede un agujero redondo por donde puedes introducir el pene antes de aplicar la crema, para proteger piel del escroto y testículos.

- No utilizar extensores mecánicos (Pueden formar nuevas placas, o lesiones vasculares, por ruptura de fibras por tracción o exceso de presión en la zona del glande o zonas contiguas a la placa actual.)

  En fases en las que la placa ya se ha eliminado o reducido bastante, se pueden usar aparatos de vacío a presiones moderadas fisiológicas 140 a 170 mm de Hg.